

Olämpliga läkemedel för äldre

Denna lista omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller. Kontakta förskrivande läkare för mer information.

Listan speglar indikatorn "Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger" som ingår i rapporten *Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre* (Socialstyrelsen 2010-6-29). Följande läkemedel ingår (juni 2016):

Långverkande bensodiazepiner Är lugnande och sömngivande läkemedel	Läkemedel med antikolinerga effekter (forts)	
Diazepam	Egazil	
Stesolid	Emselex	
Apodorm	Hydroxyzine	
Mogadon	Kentera	
Nitrazepam	Ketogan	
Flunitrazepam	Klomipramin	
Tramadol Mot smärta	Leponex	
Dolatramyl	Lergigan	
Gemadol	Levomepromazine	
Nobligan	Ludiomil	
Tiparol	Maprotilin	
Tradolan	Metylskopolamin	
Tramadol	Morfin-Skopolamin	
Propiomazin Används vid sömnbesvär	Nozinan	
Propavan	Oxikodon-hyoscin	
Läkemedel med antikolinerga effekter Används t.ex. vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta	Oxybutynin	
Akineton	Buscopan	Pargitan
Alimemazin	Calma	Proklorperazin
Amitriptylin	Clozapine	Robinul
Anafranil	Desentol	Saroten
Atarax	Detrusitol	Scopoderm
Atropin	Ditropan	Sensaval
Atyxine	Durbis	Spasmoden
		Theralen
		Tolterodin
		TOVIAZ
		Truxal
		Vesicare